

*Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte*

INTERROGAZIONE N. 1277

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e dell'articolo 99 del Regolamento interno

OGGETTO: Farmaco antivirale Paxlovid: il suo protocollo di utilizzo in Piemonte è adeguato?

Premesso che

Il Paxlovid è un farmaco antivirale per il trattamento precoce della malattia COVID-19, la cui somministrazione è indicata per gli adulti che non necessitano di ossigenoterapia supplementare e che sono ad elevato rischio di progressione a Covid-19 severa. Dalle analisi che hanno portato all'approvazione del farmaco è emerso che la somministrazione deve avvenire entro 5 giorni dalla positività. Se somministrato precocemente, paxlovid si è dimostrato utile nel ridurre dell'89% il rischio di ricovero e decesso per Covid-19 a 28 giorni dalla positività. Non solo, dalle analisi è emersa una ridotta carica virale in chi aveva ricevuto il farmaco rispetto al placebo.

verificato che

L'efficacia del Paxlovid è associata a una importante diminuzione del tasso di ospedalizzazione.

Nel report pubblicato il 25 novembre 2022 a cura dei *Centers for Disease Control and Prevention* (Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie), un importante organismo di controllo sulla sanità pubblica degli Stati Uniti d'America, "Tra gli adulti statunitensi con diagnosi di COVID-19, compresi quelli con precedente infezione o vaccinazione, le persone a cui è stato prescritto Paxlovid entro 5 giorni dalla diagnosi hanno avuto un tasso di ospedalizzazione inferiore del 51% entro 30 giorni dalla diagnosi rispetto a coloro a cui non è stato prescritto Paxlovid."

sottolineato che

La principale raccomandazione inerente il Paxlovid riguarda la tempistica: “Paxlovid” deve essere assunto entro cinque giorni dall’insorgenza dei primi sintomi e il trattamento non deve essere interrotto anche nel caso in cui il paziente dovesse poi essere ricoverato per una serie di complicanze derivanti in primis dalla sua pregressa condizione.

verificato che

A differenza del test rapido, il test molecolare per verificare la presenza del virus COVID-19 costa di più e dà il risultato solo il giorno dopo, a discapito delle raccomandazioni riguardanti la tempestività con cui il Paxlovid deve essere assunto dall’insorgenza dei primi sintomi.

INTERROGA

Il Presidente della Giunta Regionale

per avere chiarimenti esaustivi in merito a quanto segue:

- Se in Piemonte, a fronte della possibilità da parte del medico di famiglia di prescrivere il Paxlovid, tale farmaco viene somministrato solo a fronte di un esito positivo del test molecolare oppure è sufficiente anche il test rapido.
- La spesa affrontata dalla Regione Piemonte per l’acquisto dell’antivirale orale Paxlovid prescritto per la terapia contro il Covid-19, ripartita mensilmente nelle varie ASL nel corso dell’anno 2022.
- Se la Regione Piemonte adotta le medesime linee guida sui criteri di utilizzo del Paxlovid in essere nelle altre regioni, in ottemperanza alla Determina AIFA del 20/04/2022 con la quale l’Agenzia Italiana del Farmaco ha emesso disposizioni inerenti il farmaco antivirale anti-Covid-19 PAXLOVID.

Daniele Valle